

Ihre Patientin/Ihr Patient hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus und appliziert
Humalog Mix® oder Insuman Comb 25®

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

1 Tag vor der Untersuchung:

- Am Morgen die gewohnte und (falls 2x/d gespritzt) am Abend die halbe Insulindosis.

am Untersuchungstag:

- Am Morgen der Untersuchung KEIN Insulin spritzen.
- Nachholen der aufgeschobenen Insulin-Applikation in gewohnter Dosierung, sobald die Patienten wieder normal essen können (Mahlzeiten-Insulin ausschliesslich zur ersten richtigen Hauptmahlzeit).

Ihre Patientin/Ihr Patient hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus und appliziert

NovoRapid®, Apidra®, Humalog® oder Ryzodeg®:

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

1 Tag vor der Untersuchung:

- Tagsüber nach gewohntem Schema. Kein Insulin mehr zum Abendessen

am Untersuchungstag:

- Mahlzeiten-Insulin am Morgen oder Mittag:
 - Am Morgen der Untersuchung KEIN Insulin spritzen.
 - Nachholen der aufgeschobenen Insulin-Applikation in gewohnter Dosierung, sobald die Patienten wieder normal essen können (Mahlzeiten-Insulin ausschliesslich zur ersten richtigen Hauptmahlzeit).
- Ryzodeg® am Abend:
 - Gewohnte Dosierung (Ryzodeg® ausschliesslich mit Hauptmahlzeit).

Ihre Patientin/Ihr Patient hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus und appliziert

Lantus® , Levemir® , Abasaglar® oder Toujeo®

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

- 2 Tage vor der Untersuchung: normale Applikation. Bei Hypoglykämie-Neigung oder sehr scharfer Einstellung (HbA1c <6.5%); 2/3 der gewohnten Insulindosis
- 1 Tag vor der Untersuchung:
 - **Basis-Insulin am Abend:** die Hälfte der gewohnten Dosis und Kontrolle des Blutzuckers vor dem Zubettgehen (< 6 mmol/l: Zwischen-Mahlzeit und nachmessen)
 - **Basis-Insulin am Morgen:** 2/3 der gewohnten Dosis und Kontrolle des Blutzuckers im Tagesprofil
- am Untersuchungstag:
 - **Basis-Insulin am Abend:** abends wieder die gewohnte Dosis, vorausgesetzt, dass die Patienten normal essen können und die Blutzuckerwerte vor dem Abendessen über 6 mmol/l liegen
 - **Basis-Insulin am Morgen:** die Hälfte der gewohnten Dosis NACH der Endoskopie, vor dem Essen. Blutzucker-Tagesprofil

Wir möchten Sie bitten, das Vorgehen mit dem Patienten zu besprechen.

Ihre Patientin/Ihr Patient hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus und appliziert

Tresiba® , Xultophy®

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

- 2 Tage vor der Untersuchung: Applikation der Hälfte der Dosis
- 1 Tag vor der Untersuchung: Applikation der Hälfte der Dosis
- am Untersuchungstag:
 - am Morgen der Untersuchung: kein Insulin applizieren
 - nach der Untersuchung: **bei Morgen- oder Mittagsdosis** Insulin nach der Untersuchung in gewohnter Dosierung nachgeben, sobald wieder normal gegessen werden kann. **Bei Abenddosis** Insulin wie gewohnt am Abend applizieren

Wir möchten Sie bitten, das Vorgehen mit dem Patienten zu besprechen.

Ihre Patientin/Ihr Patient hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus und hat **eine Insulinpumpe**

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

- 1 Tag vor der Untersuchung:
 - Basalrate 2 Stunden nach dem Mittagessen auf 80% einstellen.
 - Bis nach der Untersuchung keine Boli mehr spritzen.
- am Untersuchungstag:
 - Basalrate vor der ersten Mahlzeit wieder auf 100% einstellen.
 - Keine Boli vor der ersten Mahlzeit.
 - Pumpe nicht ausziehen.

Wir möchten Sie bitten, das Vorgehen mit dem Patienten zu besprechen.